

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Enny Murwaningtyas

Assignment title: Periksa similarity

Submission title: penetuan harga opsi tipe eropa yang aset dasarnya mengik...

File name: ga_opsi_tipe_eropa_yang_aset_dasarnya_mengikuti_proses_g...

File size: 6.89M

Page count: 8

Word count: 3,101

Character count: 16,651

Submission date: 20-Mar-2023 01:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2041481829

Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Periode II Yosvakaria, 11 Desember 2010

ISSN: 1979-911X

PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA YANG ASET DASARNYA MENGIKUTI PROSES GARCH

Custarina Bully mutraulingyass Staf Pengajar Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta E-mail: enny@usd.ac.id

INTISARI kedastic (ARC

tahm 1952 dengan mengenalkan konsep conditional hierorocidustis, sebaah kontep teetang keridikkkonstansuriansi dari dari narinon. Dan perubahan variansi did dengan himodo. Dan perubahan variansi did dengan himodo. Dan perubahan variansi did dengan himodo. Dan perubahan sebahan yang keridikkonstansuriansi dalam untun waktu. Sedangkan Bolherise (1958) mengembangkan lebih lanjut model ARCH menjeli model peruralized autorograpi conditional herestocidustic (GARCH). Dalam model GARCH, perubahan variansitya, selain dipengunki oleh beberapa dan random sebeluanya, juga dipengunki oleh siguinlah variansi dari plata random sebeluanya. Dengan mengenjadahan model GARCH kita dapat reperdikakan banga salam random sebeluanya. Dengan menguhahan model GARCH kita dapat reperdikakan banga salam kalam perupakan perupakan perupakan salam kortrak satura dan pilak dimana salah atan pilak deman salah salah pilak himakan sebeluan perupakan salah kortrak saturak dari pelak diman salah atan pilak diman salah salah salah

Kata kunci: GARCH, opsi tipe Eropa

PENDAHULUA

Opi sunggab popular dan mendania di tengah kegistan pasar ekonomi dalam beberapa delasde ini Tidak hanya di bursarbesa besar sperfi Tangreno Opinton Ecolomge di Amsterdami and di Chicego, Brossan Antara Carbonge (EOIC), tetga di bersa kecil sperif di Sydney pan telah menperdagangkan opia. Di semesara Axia Tengara sperit Singapun Akhlosiya, din Filipian kola han ketinggian menerperdagangkan opia. Da semana Axia Tengara sperit Singapun Akhlosiya, din Filipian kola han ketinggian menerperdagangkan opia. Da semana da semana pan semana pan semana semana semana semana semana pan pan bedaka secara remi sejak 6 Oktober 2004. Wakapun opi manya memberlaka kemanagan yang besara, amam para invester sangat perla bertakat dalam melakukan kegistan pasar dengar opia, keran sehin opis its sangat kompleks, opis juga mengandang ratiko mengalami kerugian yang disebabkan kerandoman yang disebabkan seria semana pan semana hanga sahun (ilasa setak seria opis dadah sebasha) yang dibalterandoman yang disebabkan seria semana semana

mementu.

se descris nederinan dapud dijelakan habon sopin merupakan sutah kontra datara dan pilak dimana talas mjaha (pembal) memilit laka, bahas hawajian, sutah kontradi sam menjada diri pinka lain fersalisa sutah kerupakan sutah membali sam melakutiran (piniman) atasa sate tertemi seperti halapu saham, dengan haray sang telah ditentukan (Gereja kara), dengan haray sang telah ditentukan (Gereja kara), dalah saham, maka opi tersebed ditittilakan opis saham. Dalam hal opis, sate yang melandasinya idaki hanya saham, maka opi tersebed distitukan opis samam. Dalam hal opis, sate yang nendansianya idaki hanyang pemu hunuk memusukan menjalankan opis tersebut satu tilak. Jika opis tersebut distitukan, tetepi sabalkanya, dan opis tersebut satu tilak. Jika opis tersebut distitukan, tetepi sabalkanya, ban opis tersebut satu tilak. Jika opis tersebut distitukan, tetepi sabalkanya, ban opis tersebut satu tilak. Jika opis tersebut distitukan kenguntukan kataya kengungan opis tersebut distitukan kenguntukan kataya kengungan dan hakaya. Apabila pada sasti jash tempo pemegang opis tidak menguntukan kataya, maka hat tersebut akan halang dengan sendiraya. Dengan denkakin opis jang dimilikaya dakan tempunya tilah laga dakan tersebut akan halang dengan sendiraya. Dengan denkahan opis jang dimilikaya daka menupunja dilah daka menupunja dalah selakut dakan daka

Opsi dibedakan menurul jeninya, yaitu opsi culf dan opsi jun. Opsi culf dalah hak untuk membe atan sekurina, sendapan onju par dalah hak untuk membe atan sekurina, sendapan onju par dalah hak untuk membe juntuk selurina. Opsi jung dibedakan atas wekt penbayaran (waktu dimana opsi tersebut dijalankan). Ada dan tipe opsi menurut waktu penbayaran, yaitu opti e Amerika dan opti the Forse, Ossi tipe Amerika dan bon opi ten Gerban opi di per Sendapan tipe Amerika dan opi the Forse, Ossi tipe Amerika dan opi to perbandikansakan kapan atat tanggal pembelian sampai masa jatah temponya (ampai usia opi tersebut berakhir). Sedangkan opat tipe Erop seksh onoi ware huron dansa dilakusahan sada masa isah tempo opi tersebut.

Black dan Scholes (1973) memperkentikan sebuah formula penentuan harga opi dalam boratil peraman differential, yang dikenal sebuah opi Black-Scholes, yang dapat membantu para inswestor saham menemikan apakah harga opi terdah unhal atau sebalikaya terlah menh relafi terkasah para saham pada saat in. Formula Black-Scholes tersebat sangar parkit, kazera variab-levarishel injust yang dibumbian tersedia secara tumum. Selain formish yang diperkenalkan oleh Black dan Scholes, gada wakta hangib tesamana, Merton (1973) bederig secara tenpish menemikan formula yang sama.

Dalam bebarrapa penelitian yang beberbeda telah dibahas model runtun waktu untuk return saham ya model yang berdasarkan heterokedastic. (Model autoregresif conditional heterokedastic (ARCII) pertuna k diperkenalkan oleh Engle pada tahun 1982 denga mengenalkan konsep Conditional Heteroscedastic, sebu

penetuan harga opsi tipe eropa yang aset dasarnya mengikuti proses garch

by Murwaningtyas Enny

Submission date: 20-Mar-2023 01:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2041481829

File name: ga_opsi_tipe_eropa_yang_aset_dasarnya_mengikuti_proses_garch.pdf (6.89M)

Word count: 3101 Character count: 16651

PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA YANG ASET DASARNYA MENGIKUTI PROSES GARCH

ISSN: 1979-911X

Chatarina Enny Murwaningtyas

Staf Pengajar Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, E-mail: enny@usd.ac.id

INTISARI

Model autoregresif conditional heteroskedastic (ARCH) pertama kali diperkenalkan oleh Engle pada tahun 1982 dengan mengenalkan konsep conditional heteroscedastic, sebuah konsep tentang ketidakkonstanan variansi dari data random. Dan p 5 bahan variansi ini dipengaruhi oleh data random sebelumnya yang tersusun dalam urutan waktu. Sedangkan Bollerslev (1986) m 1 gembangkan lebih lanjut model ARCH menjadi model generalized autoregresif conditional heteroskedastic (GARCH). Dalam model GARCH, perubahan variansinya, selain dipengaruhi oleh beberapa data random sebelumnya, juga dipengaruhi oleh sejumlah variansi dari data random sebelumnya. Dengan menggunakan model GARCH kita dapat meprediksikan harga saham menggunakan data historisnya. Dan jika harga saham d 6 at diprediksi kita juga dapat memprediksi harga opsi, khususnya opsi tipe Eropa. Opsi tipe Eropa merupakan suatu kontrak antara dua pihak dimana salah satu pihak (pembeli) memiliki hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual dari pihak lain (penjual), suatu saham tertentu, dengan harga yang telah ditentukan/disepakati pada akhir periode waktu yang juga telah ditentukan. Makalah ini membahas model penentuan harga opsi tipe Eropa menggunakan GARCH.

Kata kunci: GARCH, opsi tipe Eropa

PENDAHULUAN

Opsi sunggul 3 popular dan mendunia di tengah kegiatan pasar ekonomi dalam beberapa dekade ini. Tidak hanya di bursa-bursa besar seperti European Options Exchange 3 i Amsterdam dan di Chicago Board Options Exchange (CBOE), tetapi di bursa kecil seperti di Sydney pun telah memperdagangkan opsi. Di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina tidak 3 au ketinggalan memperdagangkan opsi di bursa resmi yang terorganisir. Di Indonesia, perdagangan opsi baru disimulasikan di Bursa Efek Jakarta pada paro kedua tahun 2003 dan dibuka secara resmi sejak 6 Oktober 2004. Walaupun opsi mampu memberikan keuntungan yang besar, namun para investor sangat perlu berhati-hati dalam melakukan kegiatan pasar dengan opsi, karena selain opsi itu sangat kompleks, opsi juga mengandung resiko mengalami kerugian yang disebabkan kerandoman yang ditimbulkan dari perubahan harga saham (jika aset dasar dari opsi adalah saham) yang tidak menentu

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa opsi merupakan suatu kontrak antara dua pihak dimana salah satu pihak (pembeli) memiliki hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual dari pihak lain (penjual), suatu sekuritas (jaminan) atau aset tertentu seperti halnya saham, dengan harga yang telah ditentukan/disepakati ke price) dalam periode waktu yang juga telah ditentukan (exercise time). Jika aset yang melandasinya ah saham, maka opsi tersebut diistilahkan opsi saham. Dalam hal opsi, aset yang melandasinya tidak hanya saham, tetapi ada juga indeks saham, nilai mata uang, obligasi, dan lain-lain. Pemegang opsi mempunyai hak yang penuh untuk memutuskan menjalankan opsi tersebut atau tidak. Jika opsi tersebut menguntungkan, maka opsi tersebut dijalankan, teta sebaliknya jika opsi tersebut tidak menguntungkan, maka pemegang opsi boleh tidak menggunakan haknya. Apabila pada saat jatuh tempo pemegang opsi tidak menggunakan haknya, maka hak tersebut akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian opsi yang dimilikinya tidak mempunyai nilai lagi atau nilainya nol.

Opsi dibedakan menurut jenisnya, yaitu opsi call dan opsi put. Opsi call adalah hak untuk membeli suatu sekuritas, sedangkan opsi put adalah hak untuk menjual suatu sekuritas. Opsi juga dibedakan a12 waktu pembayaran (waktu dimana opsi tersebut dijalankan). Ada dua tipe opsi menurut waktu pembayaran, yaitu opsi tipe Amerika dan opsi tipe Eropa. Opsi tipe Amerika adalah opsi yang dapat dilaksanakan ka121 saja antara tanggal pembelian sampai masa jatuh temponya (sampai usia opsi tersebut berakhir). Sedangkan opsi tipe Eropa adalah opsi yang hanya dapat dilaksanakan pada masa jatuh tempo opsi tersebut.

Black dan Scholes (1973) memperkenalkan sebuah formula penentuan para opsi dalam bentuk persamaan diferensial, yang dikenal sebagai formula harga opsi Black-Scholes, yang dapat membantu para investor saham menentukan apakah harga opsi terlalu mahal atau sebaliknya terlalu murah relatif terhadap harga saham pada saat itu. Formula Black-Scholes tersebut sangat praktis, karena variabel-variabel input yang dibutuhkan tersedia secara umum. Selain formula yang diperkenalkan oleh Black dan Scholes, pada waktu hampir bersamaan, Merton (1973) bekerja secara terpisah menemukan formula yang sama.

Dalam bebarapa penelitian yang beberbeda telah diba 175 model runtun waktu untuk return saham yaitu model yang berdasarkan heterokedastic. Model autoregresif conditional heteroskedastic (ARCH) pertama kali diperkenalkan oleh Engle pada tahun 1982 dengan mengenalkan konsep Conditional Heteroscedastic, sebuah

¹3

konsep tentang ketidak-konstanan variansi dari data random. Dan perubahan variansi ini dipengaruhi oleh data random sebelumnya yang tersusun dalam urutan waktu. Sedangkan Bollerslev (1986) mengambangkan lebih lanjut model ARCH menjadi model generalized autoregresif conditional heteroskedastic (GARCH). Dalam model GARCH, perubahan variansinya, selain dipengaruhi oleh beberapa data random sebelumnya, juga dipengaruhi oleh sejumlah variansi dari data random sebelumnya. Model yang ditawarkan melalui GARCH terkesan lebih masuk akal untuk memodelkan urutan waktu data random dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Makalah ini akan membahas penentuan harga opsi menggunakan model runtun waktu GARCH.

PEMBAHASAN

Model Harga Saham

Peningkatan harga saham dibangun dengan menggunakan proses Brownian motion standar. Misalkan (Ω, \mathcal{F}, P) adalah basis stokastik, dengan Ω himpunan semesta, \mathcal{F} adalah σ -field, P adalah ukuran pada (Ω, \mathcal{F}) , dan $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ adalah filtration. Proses $\{B_t\}_{t\geq 0}$ adalah proses Brownian motion berkenaan dengan ukuran P. Misalkan $\sigma > 0$ adalah koefisien volatility (fluktuasi harga saham/deviasi standar return saham), dan $\mu \in \mathbb{R}$ adalah appreciation rate(ekspektasi return saham). Peningkatan dari harga saham S ditentukan dengan proses random sebagai berikut:

$$dS_t = S_t(\mu dt + \sigma dB_t) \tag{1}$$

Jika persamaan (1) dicari penyelesaiannya maka diperoleh

$$S_t = S_0 \exp\left\{ \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma B_t \right\}$$
 (2)

Proses random yang didefinisikan seperti pada Persamaan (2) pertama kali dibicarakan oleh Samuelson (1965) dan selanjutnya proses random tersebut dinamakan geometric (economic) Brownian motion. Jika akan diperhatikan harga saham pada saat t-1 maka persamaan (2) akan menjadi

$$S_{t-1} = S_0 \exp\left\{ \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t-1) + \sigma B_{t-1} \right\}$$
 (3)

Dan persamaan (3) dapat ditulis dalam bentuk

 $S_0 = S_{t-1} \exp\left\{-\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(t-1) - \sigma B_{t-1}\right\}$ (4)

19

lika persamaan (4) disubtitusikan ke persamaan (2) maka diperoleh

$$S_{t} = S_{t-1} \exp\left\{-\left(\mu - \frac{\sigma^{2}}{2}\right)(t-1) - \sigma B_{t-1}\right\} \exp\left\{\left(\mu - \frac{\sigma^{2}}{2}\right)t + \sigma B_{t}\right\}$$

$$= S_{t-1} \exp\left\{\left(\mu - \frac{\sigma^{2}}{2}\right) + \sigma (B_{t} - B_{t-1})\right\}$$
(5)

Karena $\{B_i\}_{i\geq 0}$ adalah proses Brownian motion berkenaan dengan ukuran P, maka

$$B_t - B_{t-1} \sim B \sim N(0,1)$$

Misalkan $\varepsilon_i \mid \mathcal{F}_i \sim N(0, \sigma^2)$ dengan ε_i terukur- \mathcal{F}_i , maka harga saham satu periode berikutnya adalah

$$S_t = S_{t-1} \exp\left\{\mu - \frac{\sigma^2}{2} + \varepsilon_t\right\} \tag{6}$$

Jika dimisalkan $\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$ dengan r adalah koefisien bebas resiko, sehingga persamaan (6) menjadi

$$S_{t} = S_{t-1} \exp \left\{ r - \frac{\sigma^{2}}{2} + \lambda \sigma + \varepsilon_{t} \right\}$$
 (7)

Karena variansi dalam model GARCH tidak konstan dan bergantung pada waktu, maka persamaan (7) tersebut dapat ditulis kembali dalam bentuk

$$\ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right) = r - \frac{\sigma_t^2}{2} + \lambda \sigma_t + \varepsilon_t \tag{8}$$

dengan \mathcal{E}_t memiliki rata-rata nol dan variansi bersyaratnya σ_t^2 terhadap ukuran probabilitas P, r adalah koefisien bebas resiko, dan λ adalah konstanta unit resiko premi. Persamaan (8) ini disebut model return saham. Berdasarkan asumsi lognormal maka nilai harapan dari return adalah $\exp(r-\sigma_t^2/2+\lambda\sigma_t)$ dan variansinya adalah σ_i^2 .

Asumsi lebih jauh dalam model return saham ini adalah E, mengikuti model GARCH dari Bollerslev (1986) terhadap ukuran P, yaitu

$$\varepsilon_{t} \mid \mathcal{F}_{t} \sim N(0, \sigma_{t}^{2})$$

$$\sigma_{t}^{2} = \alpha_{0} + \sum_{i=1}^{q} \alpha_{i} \varepsilon_{t-i}^{2} + \sum_{i=1}^{p} \beta_{i} \sigma_{t-i}^{2}$$
(9)

dengan \mathcal{F}_i adalah himpunan informasi pada waktu $t, p > 0, q > 0, \alpha_i \ge 0$ dan $\beta_i \ge 0$.

Hubungan Nilai Resiko Netral Lokal

Nilai resiko netral konvensional tidak mengakomodasi heteroskedastisitas dari return saham. Hubungan nilai resiko netral lokal (local risk-neutral valuation relationship/LRNVR) adalah bentuk umum dari nilai risiko netral yang mengakomodasi heteroskedastisitas.

Definisi 1

Suatu nilai ukuran Q dikatakan memenuhi hubungan nilai resiko netral lokal jika ukuran Q saling kontinu mutlak berkenaan dengan ukuran P, $S_t/S_{t-1} \mid \mathcal{F}_{t-1}$ berdistribusi log normal (dengan ukuran Q),

$$E^{\varrho}\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right) = e^{r} \tag{10}$$

$$Var^{Q}\left(\ln\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\right)\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right) = Var^{P}\left(\ln\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\right)\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right)$$
(11)

hampir pasti yang berkenaan dengan ukuran P

Misalkan suatu proses Y_t sedemikian hingga $Y_t | \mathcal{F}_t$ berdistribusi normal dengan rata-rata dan variansi konstan terhadap ukuran-P. Didefinisikan Q dengan $dQ = \exp((r-\rho)T + \sum_{t=1}^{T} Y_t)dP$. Hal ini berakibat bahwa Q adalah ukuran dan saling kontinu mutlak berkenaan dengan ukuran P.

Jika $S_{t-1} = E^P(S_t \exp(-\rho + Y_t) | \mathcal{F}_{t-1})$, maka 1) Q adalah ukuran probabilitas

- 2) untuk variabel random W, terukur- \mathcal{F} , maka $E^{Q}[W_{t}|\mathcal{F}_{t-1}] = E^{P}[W_{t}\exp((r-\rho)+Y_{t})|\mathcal{F}_{t-1}]$ Bukti:

Karena diketahui $d\mathbf{Q} = \exp((r-\rho)T + \sum_{i=1}^{T} Y_i)d\mathbf{P}$ maka

$$\int 1 dQ = \int \exp((r-\rho)T + \sum_{t=1}^{T} Y_{t}) dP$$

$$= E^{P} \left(\exp((r-\rho)T + \sum_{t=1}^{T} Y_{t}) | \mathcal{F}_{0} \right)$$

$$= E^{P} \left[\exp((r-\rho)(T-1) + \sum_{t=1}^{T-1} Y_{t}) \exp((r-\rho) + Y_{T}) | \mathcal{F}_{0} \right]$$

$$= E^{P} \left[\exp\left((r-\rho)(T-1) + \sum_{t=1}^{T-1} Y_{t}\right) e^{r} E^{P} \left[\exp(-\rho + Y_{T}) | \mathcal{F}_{T-1} \right] | \mathcal{F}_{0} \right]$$

Diketahui bahwa $S_{t-1} = E^P(S_t \exp(-\rho + Y_t)|\mathcal{F}_{t-1})$ berarti $E^P(\exp(-\rho + Y_t)|\mathcal{F}_{t-1}) = e^{-r}$ dengan r adalah koefisien bebas resiko. Sehingga diperoleh

$$\int 1 dQ = E^{P} \left[\exp \left((r - \rho)(T - 1) + \sum_{t=1}^{T-1} Y_{t} \right) | \mathcal{F}_{0} \right]$$

Jika proses itu dilanjutkan maka akan diperoleh |1dQ=1 , berarti terbukti Q adalah ukuran probabilitas. Untuk pembuktian bagian selanjunya dapat dibuktikan menggunakan Teorema Radon-Nikodym, yang berakibat $e^{(r-\rho)T+\sum_{i=1}^T Y_i}$ merupakan P-as dan untuk W_i suatu variabel random terukur- \mathcal{F}_i , memenuhi $E^{Q}[W_{t}|\mathcal{F}_{t-1}] = E^{P}[W_{t}\exp((r-\rho) + Y_{t})|\mathcal{F}_{t-1}].$

Jika $S_{t-1} = E^P(S_t \exp(-\rho + Y_t)|\mathcal{F}_{t-1})$, maka 1) $S/S_{t-1}|\mathcal{F}_{t-1}$ berdistribusi log normal dengan ukuran Q_t

2)
$$E^{P}(S_{t}/S_{t-1}|\mathcal{F}_{t-1}) = e^{r}$$

2)
$$E^{P}(S_{t}/S_{t-1}|\mathcal{F}_{t-1}) = e^{r}$$

3) $Var^{Q}\left(\ln\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\right)\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right) = Var^{P}\left(\ln\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\right)\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right)$ hampir pasti yang berkenaan dengan ukuran P .

Untuk membuktikan bagian 2) digunakan Teorema 1, diperoleh

$$E^{Q}\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right) = E^{P}\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\exp((r-\rho) + Y_{t})\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right)$$
$$= \frac{e^{P}}{S_{t-1}}E^{P}\left(S_{t}\exp(-\rho + Y_{t})\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right) = e^{P}$$

Selanjutnya akan dibuktikan bagian 1) dan 3). Pada Teorema 1 bagian ke 2), telah dibuktikan

$$E^{Q}[W_{t}|\mathcal{F}_{t-1}] = E^{P}[W_{t}\exp((r-\rho)+Y_{t})|\mathcal{F}_{t-1}]$$

Untuk W_i suatu variabel random terukur- \mathcal{F}_i . Jika W_i terukur- \mathcal{F}_i , jadi W_t^c dengan $c \in \mathbb{R}$ juga terukur- \mathcal{F}_i dan berlaku juga persamaan diatas. Jadi

$$E^{\mathbb{Q}}[W_t^{\sigma}|\mathcal{F}_{t-1}] = E^{\mathbb{P}}[W_t^{\sigma}\exp((r-\rho) + Y_t)|\mathcal{F}_{t-1}]$$

$$E^{Q} \left[\frac{S_{t}^{\sigma}}{S_{t-1}^{\sigma}} \middle| \mathcal{F}_{t-1} \right] = E^{P} \left[\frac{S_{t}^{\sigma}}{S_{t-1}^{\sigma}} \exp\left((r-\rho) + Y_{t}\right) \middle| \mathcal{F}_{t-1} \right]$$

$$E^{Q} \left[\exp\left(c \cdot \ln\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\right)\right) \middle| \mathcal{F}_{t-1} \right] = E^{P} \left[\exp\left(c \cdot \ln\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\right)\right) \exp\left((r-\rho) + Y_{t}\right) \middle| \mathcal{F}_{t-1} \right]$$

Jika
$$X_t = \ln\left(\frac{S_t^c}{S_{t-1}^c}\right)$$
, maka diperoleh

$$E^{Q}[\exp(cX_{t})|\mathcal{F}_{t-1}] = E^{P}[\exp(cX_{t})\exp((r-\rho) + Y_{t})|\mathcal{F}_{t-1}]$$

Sedangkan berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui bahwa $X_l \mathcal{F}_t$ berdistribusi normal dengan rata-rata dan variansi konstan terhadap ukuran-P. Misalkan rata-rata dan variansi dari $X_t | \mathcal{F}_t$ terhadap ukuran-P adalah μ_t dan σ_t^2 , dan $Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t$ dengan U_t adalah variabel random yang lain dengan rata-rata 0. Maka

$$E^{Q}[\exp(cX_{t})|\mathcal{F}_{t-1}] = E^{P}[\exp(cX_{t} + (r-\rho) + Y_{t})|\mathcal{F}_{t-1}]$$

$$= E^{P}[\exp(cX_{t} + (r-\rho) + \alpha + \beta X_{t} + U_{t})|\mathcal{F}_{t-1}]$$

$$= \exp(r-\rho + \alpha)E^{P}[\exp((c+\beta)X_{t} + U_{t})|\mathcal{F}_{t-1}]$$
(12)

Nilai harapan dan variansi gabungan dari $(c + \beta) X_t$ dan U_t dengan ukuran P adalah

$$E[(c+\beta)X_t + U_t] = \mu_t(c+\beta)$$

$$var[(c+\beta)X_t+U_t] = (c+\beta)^2\sigma_t^2 + E^P[U_t^2]$$

Menggunakan fungsi pembangkit moment maka diperoleh

Menggunakan fungsi pembangkit moment maka diperoleh
$$E^{P}\left[\exp((c+\beta)X_{t}+U_{t})|\mathcal{F}_{t-1}\right] = \exp(\mu_{t}(c+\beta) + \frac{1}{2}((c+\beta)^{2}\sigma_{t}^{2} + E^{P}[U_{t}^{2}]))$$

$$E^{P}\left[\exp((c+\beta)X_{t}+U_{t})|\mathcal{F}_{t-1}\right] = \exp(\mu_{t}(c+\beta) + \frac{1}{2}(c^{2} + 2c\beta + \beta^{2})\sigma_{t}^{2} + \frac{1}{2}E^{P}[U_{t}^{2}])$$

$$= \exp\left(\frac{1}{2}\beta^{2}\sigma_{t}^{2} + \mu_{t}\beta + \frac{1}{2}E^{P}[U_{t}^{2}] + \frac{1}{2}c^{2}\sigma_{t}^{2} + c(\mu_{t} + \beta\sigma_{t}^{2})\right)$$

Jadi persamaan (12) menjadi

Jadi persamaan (12) menjadi
$$E^{Q}\left[\exp(cX_{t})|\mathcal{F}_{t-1}\right] = \exp\left(r - \rho + \alpha + \frac{1}{2}\beta^{2}\sigma_{t}^{2} + \mu_{t}\beta + \frac{1}{2}E^{P}\left[U_{t}^{2}\right]\right) \times \\ \exp\left(\frac{1}{2}c^{2}\sigma_{t}^{2} + c\left(\mu_{t} + \beta\sigma_{t}^{2}\right)\right)$$
 (13)

Jika c = 0 maka persamaan (13) menjadi

$$E^{Q}[1|\mathcal{F}_{t-1}] = 1 = \exp(r - \rho + \alpha + \frac{1}{2}\beta^{2}\sigma_{t}^{2} + \mu_{t}\beta + \frac{1}{2}E^{P}[U_{t}^{2}])$$
Bila Persamaan (14) disubtitusikan ke Perasamaan (13), maka diperoleh

$$E^{\varrho}[\exp(cX_t)|\mathcal{F}_{t-1}] = \exp\left(\frac{1}{2}c^2\sigma_t^2 + c(\mu_t + \beta\sigma_t^2)\right)$$
(15)

Sehingga jika c = 1 maka persamaan (15) menjadi

$$E^{\ell}[\exp(X_{t})|\mathcal{F}_{t-1}] = \exp\left(\frac{1}{2}\sigma_{t}^{2} + (\mu_{t} + \beta\sigma_{t}^{2})\right)$$

Dengan kata lain persamaan diatas adalah fungsi pembangkit moment dari X_h, jadi

$$X_t = \ln\left(\frac{S_t^{\ell}}{S_{t-1}^{\ell}}\right) \left| \mathcal{F}_{t-1} \sim N(\mu_t + \beta \sigma_t^2, \sigma_t^2) \text{ terhadap ukuran } Q$$

Jadi terbukti bagian 1. Sebelumnya telah dikatakan rata-rata dan variansi dari $X_i | \mathcal{F}_i$ terhadap ukuran-P adalah μ_t dan σ_t^2 , jadi terbukti bahwa bagian 3 dipenuhi juga.

Teorema 3

Agen ekonomi akan memaksimalkan utilitas yang diharapkan dan fungsi utilitas waktu terpisah dan aditif, maka LRNVR memenuhi tiga kondisi berikut :

- Jika penghindar resiko relatif dari fungsi utilitas bernilai konstan maka logaritma dari jumlahan konsumsi berdistribusi normal dengan mean dan variansi konstan terhadap ukuran P.
- Jika penghindar resiko absolut dari fungsi utilitas bernilai konstan maka logaritma dari jumlahan konsumsi berdistribusi normal dengan mean dan variansi konstan terhadap ukuran P.
- Jika fungsi utilitas adalah linier, maka logaritma dari jumlahan konsumsi berdistribusi normal dengan mean dan variansi konstan terhadap ukuran P.

Bukti:

1) Karena penghindar resiko relatif dari fungsi utilitas bernilai konstan maka memenuhi

Karena penghindar resiko relatif dari fung
$$\lambda_{1} = -\frac{\ln(U'(C_{t})) - \ln(U'(C_{t-1}))}{\ln(C_{t}) - \ln(C_{t-1})}$$

Sehingga diperoleh

$$\ln(U'(C_t)) - \ln(U'(C_{t-1})) = (-\lambda_1) \left(\ln(C_t) - \ln(C_{t-1}) \right)$$

$$\ln\left(\frac{U'(C_t)}{U'(C_{t-1})}\right) = (-\lambda_1)\ln\left(\frac{C_t}{C_{t-1}}\right)$$

Karena telah diasumsikan $\ln(C_t/C_{t-1})$ berdistribusi 7 ormal dengan rata-rata dan variansi konstan terhadap ukuran P, maka $\ln(U'(C_t)/U'(C_{t-1}))$ juga berdistribusi normal dengan rata-rata dan variansi konstan terhadap ukuran P.

2) Karena penghindar resiko absolut dari fungsi utilitas bernilai konstan maka memenuhi

$$\lambda_2 = -\frac{\ln(U'(C_t)) - \ln(U'(C_{t-1}))}{C_t - C_{t-1}}$$

Sehingga diperoleh

$$\ln(U'(C_{t})) - \ln(U'(C_{t-1})) = (-\lambda_{2})(C_{t} - C_{t-1})$$

$$\ln\left(\frac{U'(C_t)}{U'(C_{t-1})}\right) = (-\lambda_2)(C_t - C_{t-1})$$

Karena telah diasumsikan $C_t - C_{t-1}$ berdistrikan in normal dengan rata-rata dan variansi konstan terhadap ukuran P, maka $\ln(U'(C_t)/U'(C_{t-1}))$ juga berdistribusi normal dengan rata-rata dan variansi konstan terhadap ukuran P.

3) Karena fungsi utilitas adalah linier, sehingga

$$U(C_i) = a C_i + c$$

Maka

$$U'(C_i) = a \operatorname{dan} \frac{\mathbf{v}'(\mathbf{c}_t)}{\mathbf{v}'(\mathbf{c}_{t-1})} = 1$$

Jadi rasio marginal utilitas

$$\ln\left(\frac{U'(C_t)}{U'(C_{t-1})}\right) = 0 \sim N(0,0)$$

ISSN: 1979-911X

Jadi dapat disimpulkan dalam ketiga kondisi diatas, jelas bahwa $\ln(U'(C_t)/U'(C_{t-1}))$ berdistribusi normal dengan rata-rata dan variansi konstan terhadap ukuran P.

Model Harga Opsi Garch

Pada bagian ini akan dibahas mengenai harga opsi GARCH dengan hubungan nilai resiko netral lokal dipenuhi.

Teorema 4

LRNVR berakibat bahwa, terhadap ukuran Q,

$$\ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right) = r - \frac{\sigma_t^2}{2} + \lambda \sigma_t + \xi_t$$

dengan

$$\xi_i \mid \mathcal{F}_i \sim N(0, \sigma_i^2)$$

dan

$$\sigma_{t}^{2} = \alpha_{0} + \sum_{i=1}^{q} \alpha_{i} (\xi_{t-1} - \lambda \sigma_{t-1})^{2} + \sum_{i=1}^{p} \beta_{i} \sigma_{t-i}^{2}$$

Bukti :

Pada Teorema 2 telah dibuktikan $\ln(S/S_{t-1}) \mid \mathcal{F}_{t-1}$ berdistribusi normal terhadap ukuran Q. Misalkan

$$\ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right) = v_t + \xi_t \tag{16}$$

dengan v, adalah variabel random yang berdistribusi normal dan memiliki rata-rata 0 dan variansi sama dengan $ln(S/S_{t-1})$. Dengan kata lain akan dibuktikan bahwa

1.
$$v_t = r - \frac{1}{2}\sigma_t^2$$

2.
$$\sigma_{i}^{2} = \alpha_{0} + \sum_{i=1}^{q} \alpha_{i} (\xi_{i-1} - \lambda \sigma_{i-1})^{2} + \sum_{i=1}^{p} \beta_{i} \sigma_{i-i}^{2}$$

Persamaan (16) dapat ditulis kembali dalam bentuk

$$\frac{S_t}{S_{t-1}} = \exp(v_t + \xi_t) \tag{17}$$

$$S_{t-1}$$
Bila kedua ruas dicari nilai harapannya terhadap ukuran Q , maka diperoleh
$$E^Q \left[\frac{S_t}{S_{t-1}} \middle| \mathcal{F}t \right] = E^Q \left[\exp \left(v_t + \xi_t \right) \middle| \mathcal{F}t \right] = \exp \left(v_t \right) \cdot E^Q \left[\exp \left(\xi_t \right) \middle| \mathcal{F}t \right]$$
Maka dengan fungsi pembangkit moment untuk variabel random yang berdistribusi normal diperoleh

$$E^{Q}\left[\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\middle|\mathcal{F}t\right] = \exp\left(v_{t} + \frac{1}{2}Var^{Q}\left(\ln\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\right)\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right)\right) \cdot E^{Q}[1|\mathcal{F}t]$$
(18)

berbunyi,

Menggunakan Teorema 2 bagian ke 3 yang berbunyi, $Var^{\varrho}\left(\ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right)\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right) = Var^{\varrho}\left(\ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right)\middle|\mathcal{F}_{t-1}\right) = \sigma_t^2$, maka persamaan (18) dapat ditulis sebagai

$$E^{Q}\left[\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\middle|\mathcal{F}t\right] = \exp\left(v_{t} + \frac{1}{2}\sigma_{t}^{2}\right) \tag{19}$$

$$E^{Q}\left[\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\middle|\mathcal{F}t\right] = e^{r} \tag{20}$$

Jika persamaan (20) di subtitusikan ke persamaan (19) maka diperoleh

$$\exp\left(v_{t} + \frac{1}{2}\sigma_{t}^{2}\right) = e^{r}$$

Sehingga terbukti bagian 1 yaitu $v_t + \frac{1}{x}\sigma_t^2 = r$ atau $v_t = r - \frac{1}{x}\sigma_t^2$. Perhatikan kembali model harga saham dengan GARCH yang diyatakan dalam persamaan (8), seperti berikut

$$\ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right) = r - \frac{\sigma_t^2}{2} + \lambda \sigma_t + \varepsilon_t \tag{21}$$

Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Periode II Yogyakarta, 11 Desember 2010

Sedangkan hasil pembuktian pada bagian 1 diatas menghasilkan

$$\ln\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\right) = r - \frac{1}{2}\sigma_{t}^{2} + \xi_{t} \tag{22}$$

Dan menggunakan kembali bagian 3 dalam Teorema 3, seperti berikut

Dan menggunakan kembah bagian 3 dalam Teorema 3, seperti berikut
$$Var^{Q} \left(\ln \left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}} \right) \middle| \mathcal{F}_{t-1} \right) = Var^{P} \left(\ln \left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}} \right) \middle| \mathcal{F}_{t-1} \right)$$
 Jika persamaan (21) dan (22) saling disubtitusikan, maka dihasilkan persamaan berikut
$$r - \frac{1}{2} \sigma_{t}^{2} + \lambda \sigma_{t} + \varepsilon_{t} = r - \frac{1}{2} \sigma_{t}^{2} + \xi_{t}$$

$$r - \frac{1}{2}\sigma_i^2 + \lambda\sigma_i + \varepsilon_i = r - \frac{1}{2}\sigma_i^2 + \xi_i$$

Maka

$$\varepsilon_{t} = \xi_{t} - \lambda \sigma_{t} \tag{23}$$

Jika persamaan (23) disubtitusikan ke persamaan (9) maka diperoleh

$$\sigma_i^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i (\xi_i - \lambda \sigma_i)^2 + \sum_{i=1}^p \beta_i \sigma_{i-i}^2$$

Jadi terbukti bagian 2.

Teorema 5

Teorema 4 mengakibatkan

$$S_T = S_t \exp\left((T - t) \cdot r - \frac{1}{2} \sum_{s=t+1}^T \sigma_s + \sum_{s=t+1}^T \xi_s \right)$$

terhadap ukuran Q.

Bukti:

Menggunakan Teorema 4 diperoleh $\ln(S_t/S_{t-1}) = r - \frac{1}{2}\sigma_t^2 + \xi_t$, untuk setiap $t \in \mathbb{R}$ terhadap ukuran Q maka

$$\ln\left(\frac{S_{t}}{S_{t-1}}\right) = \sum_{s=t+1}^{T} \ln\left(\frac{S_{s}}{S_{s-1}}\right) = \sum_{s=t+1}^{T} \left(r - \frac{1}{2}\sigma_{s}^{2} + \xi_{s}\right) = \sum_{s=t+1}^{T} r - \sum_{s=t+1}^{T} \frac{1}{2}\sigma_{s}^{2} + \sum_{s=t+1}^{T} \xi_{s}$$

$$= (T - t) \cdot r - \sum_{s=t+1}^{T} \frac{1}{2}\sigma_{s}^{2} + \sum_{s=t+1}^{T} \xi_{s}$$

Sehingga

$$S_T = S_t \exp\left((T - t) \cdot r - \frac{1}{2} \sum_{s=t+1}^T \sigma_s + \sum_{s=t+1}^T \xi_s \right)$$

Dengan kata lain terbukti teorema diatas.

Teorema 6

Proses diskonto $e^{-r}S_t$ adalah martingale terhadap ukuran Q.

Bila Teorema 5 sedikit dimodifikasi maka diperoleh

$$S_{t} = S_{t-1} \exp\left(r - \frac{1}{2}\sigma_{t} + \xi_{t}\right)$$

$$\tag{24}$$

Sehingga nilai harapan bersyarat dari e-"S, adalah

Settingga inia harapan bersyarat daire
$$S_t$$
 datamate $E^{Q}[\exp(-rt)S_t|\mathcal{F}_{t-1}] = E^{Q}[\exp(-rt)S_{t-1}\exp(r-\frac{1}{2}\sigma_t^2+\xi_t)|\mathcal{F}_{t-1}]$

$$= S_{t-1}\exp(-r(t-1))E^{Q}[\exp(-\frac{1}{2}\sigma_t^2+\xi_t)|\mathcal{F}_{t-1}]$$

Karena $\xi_i \mid \mathcal{F}_i \sim N(0, \sigma_i^2)$ terhadap ukuran Q, dan menggunakan fungsi pembangkit moment $E^{Q}\left[\exp(\xi_{r})|\mathcal{F}_{r-1}\right] = \exp\left(\frac{1}{2}\sigma_{r}^{2}\right)$, maka diperoleh

$$E^{\varrho}[\exp(-rt)S_t|\mathcal{F}_{t-1}] = S_{t-1}\exp(-r(t-1))$$

Jadi dengan kata lain terbukti $e^{-r}S$, adalah martingale terhadap ukuran Q.

ISSN: 1979-911X

Sehingga dengan menggunakan Teorema 6, dapat ditentukan harga opsi call tipe Eropa dengan harga kontrak sebesar K dan waktu jatuh tempo T dapat ditentukan dengan rumus

 $\mathbf{C} = \exp(-rT)E^{Q}\left[\max(S_{T} - K, \mathbf{0})|\mathcal{F}_{0}\right]$ (25)

KESIMPULAN

Dalam makalah ini talah dibahas tentang tinjauan analitis dari model penentuan harga opsi dengan menggunakan model GARCH. Bila kita dapat menyusun model GARCH menggunakan data historinya maka tentu saja kita dapat menduga harga opsinya. Dan harga opsinya dapat dihitung menggunakan persamaan (25). Sedangkan persamaan (25) berdasarkan model harga saham yang digambarkan dalam persamaan (8).

DAFTAR PUSTAKA

Bartle, R.G., 1995, 'THE ELEMENTS OF INTEGRATION AND LEBESGUE MEASURE', JOHN WILEY & SONS, NEW YORK.

Black, F. dan Scholes, M., 1973, 'The Pricing of Options and Corporate Liabilities', *Journal of Political Economy*, 81, 637—654.

Bollerslev, T., 1986, 'Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity', *Journal of Econometrics*, 31, 307—327

307—327.

Duan, J.-C., 1995, 'The GARCH Option Pricing Model', Mathematical Finance, 5(1), 13—32.

Engle, R. F., 1982, 'Autoregressive Conditional Heteroscedasticity With Estimates of The Variance of United Kingdom Inflation', Econometrica, 50(4), 987—1007.

Hull, J. C., 2000, Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice-Hall, Inc

Samuelson, P.A, 1965, Rational Theory of Warrant Pricing, Industrial Managemen Review, 6, 13-31.

Tsay, R.S., 2005, "Analysis of Financial Time Series", John Wiley and Sons, New York.

penetuan harga opsi tipe eropa yang aset dasarnya mengikuti proses garch

ORIGINA	LITY REPORT		
SIMILA	- / 0 / 0	2% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
PRIMAR	SOURCES		
1	Submitted to Universitas Student Paper	Pelita Harapa	2 _%
2	www.coursehero.com Internet Source		2%
3	spicaalmilia.wordpress.co	om	1 %
4	Submitted to Universiti k Malaysia Student Paper	(ebangsaan	1 %
5	text-id.123dok.com Internet Source		1 %
6	adoc.tips Internet Source		1 %
7	journal.uncp.ac.id Internet Source		1 %
8	investorsahampemula.bl	logspot.com	1 %
9	Submitted to iGroup Student Paper		1 %

10	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	1 %
11	Maria Vianney Any Herawati. "GRAF PEMBAGI NOL DARI RING KOMUTATIF", Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology, 2022	<1%
12	libraryeproceeding.telkomuniversity.ac.id	<1%
13	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%
14	jjjlesatari.blogspot.com Internet Source	<1%
15	www.aladee.org Internet Source	<1%
16	sip.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
17	journal.fpmipa.upi.edu Internet Source	<1%
18	bookmark4india.info Internet Source	<1%
19	www.scribd.com Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude bibliography On Exclude matches < 5 words